

是时候 对您的 SHPT 负责了

什么是 SHPT?

继发性甲状旁腺功能亢进症 (SHPT) 是与慢性肾脏病 (CKD) 相关的疾病。您的身体会产生过多的甲状旁腺激素 (PTH)，导致其无法正确平衡矿物质和激素，如磷、钙和维生素 D 的水平。



为什么需要治疗 SHPT?

SHPT 是一种无声的疾病。即使您感觉不到影响，其也可能对身体内部造成损害。如果不进行治疗，SHPT 可能会导致严重的健康问题，并导致心血管事件、骨折，甚至加快透析的需求或死亡。



如何服用 Rayaldee?

建议的初始剂量是每天睡前口服一粒胶囊。医生可能会根据个人身体反应增加剂量。您应该整粒服用 Rayaldee；请勿咀嚼或打开胶囊。按照医嘱服用 Rayaldee 很重要。



如果忘记服用会怎么样?

与许多药物一样，Rayaldee 需要定期服用。如果您漏服一次，请在下一次服药时间服用 Rayaldee。不需要服用额外的剂量以弥补漏服的剂量。您可以在手机上创建日历提醒，或在床头柜附近贴便条，以便您可记住每晚服用 Rayaldee。

您还可以在手机上安装 Medisafe® 应用程序，这是移动药物管理平台 (iOS 或 Android 均适用)。

Rayaldee 如何帮助治疗 SHPT?

Rayaldee 通过缓慢提高维生素 D 水平，以降低血液中的 PTH 水平，从而帮助改善体内的矿物质失衡。

在开始服用 Rayaldee 之前，血液中的钙水平应处于正常范围 (低于 9.8 mg/dL)。



如何知道 Rayaldee 是否起效?

治疗可能需要几个月的时间才能发挥最大效果。即使您没有感觉到任何缓解，按照医嘱接受治疗也非常重要。医生将进行实验室测试，以便您了解 Rayaldee 对您的疗效。随着时间的推移，SHPT 会不断发展，并变得更加难以治疗。如果您打算停止治疗，请务必咨询医生。



如何获得保险覆盖支持?

大多数患者每月的 Rayaldee 自付费用不到 10 美元。符合条件的商业保险患者支付 0 美元.* 如果您没有药品保险覆盖或无法承担共付额，请致电医生办公室。您可能有资格参加 OPKO Connect 的患者援助计划 (PAP)，该计划提供免费药物。**

如需联系 OPKO Connect，请在星期一至星期五（美国东部时间），上午 8 点至晚上 8 点致电 1-844-414-OPKO (6756)。

请参阅背面的重要安全信息。如需完整处方信息，请访问 www.Rayaldee.com。

* 符合条件的商业保险患者可以使用 eVoucherRx™ 以 0 美元的价格购买 Rayaldee 处方药，eVoucherRx™ 是 RelayHealth 的一项计划，可在患者的药房自动节省共付额。如果您的药房不支持 RelayHealth eVoucherRx™，那么 OPKO Connect 将为符合条件的商业保险患者提供每月 0 美元的共付额计划。符合条件的医疗保险 D 部分低收入补贴患者的自付费用通常为每月 0-9.85 美元 (来源：OPKO Connect 和 Specialty Pharmacy 2022 年案例数据)

** 适用资格标准，并且需要每年重新注册

关于保持健康的问题？

医疗保健提供者是您了解病情的最佳信息来源，因此如果您有任何关于 Rayaldee 的疑问，请务必咨询医生。


可观看我们的视频库，了解如何保持健康的生活。



 YouTube



Rayaldee.com



重要安全信息

- 在开始服用 Rayaldee 之前，血液中的钙水平应处于正常范围（低于 9.8 mg/dL）。医生会告知您的钙水平是否适合开始服用 Rayaldee。
- Rayaldee 可导致高钙血症和高钙尿症（血液和尿液中的钙含量分别较高）。如果您正在服用任何其他药物，包括其他维生素 D 药物（处方或非处方维生素 D 补充剂），您应该告诉医生。医生可能会告诉您在服用 Rayaldee 期间停止服用，因为高维生素 D 水平导致钙水平过高，可能会导致心律发生严重变化或癫痫发作，需要紧急治疗。
- 告诉医生您可能正在服用的所有药物。当您服用 Rayaldee 时，如果您接受任何新处方药或开始服用任何新的非处方药，请告诉医生。
- 如果您出现任何以下高钙症状，请立即告诉医生：感觉疲倦、思维不清晰、食欲不振、恶心、呕吐、便秘、口渴加剧、排尿增多、体重减轻或任何其他异常症状或副作用。
- 当您服用 Rayaldee 时，医生会要求进行实验室检查，以了解您的 SHPT 情况。这些实验室测试还将检查您的血液中钙、磷、25-羟基维生素 D 和 PTH 的水平。根据您的测试结果，Rayaldee 剂量可能会改变或停止，直到您的实验室结果有所改善。
- 临床试验中，患者报告 Rayaldee 最常见的副作用是贫血（红细胞或血红蛋白水平低）、鼻子和/或喉咙感染、血肌酐水平高（测量肾功能的实验室测试）、呼吸急促、咳嗽、充血性心力衰竭和便秘。
- 请于睡前口服一粒 Rayaldee 胶囊；请勿咬或咀嚼药物。
- 如果您漏服一次，请在下一次服药时间服用 Rayaldee。不需要服用额外的剂量以弥补漏服的剂量。
- 请务必遵守医生的指示，包括按时完成实验室检查。

请参阅 www.Rayaldee.com 提供的重要安全性信息 (ISI) 和完整的处方信息。

