

Es momento de tomar el control de su SHPT

¿Qué es SHPT?

Hiperparatiroidismo secundario (**SHPT, por sus siglas en inglés**) es una afección asociada con la enfermedad renal crónica (**CKD, por sus siglas en inglés**). Su cuerpo produce demasiada **hormona paratiroidea (PTH, por sus siglas en inglés)**, lo que previene que el cuerpo logre el equilibrio correcto de minerales y hormonas, tales como fósforo, calcio y niveles de vitamina D.



¿Por qué hay que tratar el SHPT?

El **SHPT** es una enfermedad silenciosa. Puede estar causando **daño dentro de su cuerpo, aún cuando no sienta los efectos. Sin tratamiento, el SHPT puede causar graves problemas de salud** y producir eventos cardiovasculares, fracturas en los huesos e incluso acelerar el tiempo de diálisis o muerte.

¿Cómo puede ayudar Rayaldee?



Rayaldee eleva lentamente los niveles de vitamina D lo suficiente para disminuir los niveles de PTH en la sangre y así ayuda a los desequilibrios de minerales en el cuerpo.

Antes de comenzar Rayaldee, el nivel de calcio en la sangre debe ser normal (por debajo de 9.8mg/dL).



¿Cómo se toma Rayaldee?

La dosis inicial recomendada es **una cápsula oral diaria a la hora de acostarse a dormir**. Su médico puede aumentar la dosis dependiendo de cómo responda su cuerpo. Debe tomar la cápsula de **Rayaldee** entera; sin masticar ni romper. Es importante tomar **Rayaldee según recetado por su médico**.



¿Cómo saber si Rayaldee está trabajando?

Podría tomar varios meses para que su tratamiento alcance su máximo potencial. Aunque no sienta ninguna diferencia, es muy importante que siga el tratamiento durante el tiempo que su médico lo recete. Su médico hará pruebas de laboratorio para ver cómo **Rayaldee** está funcionando. Con el tiempo, el **SHPT** puede progresar y ser más difícil de tratar. **Siempre hable con su médico si planifica suspender el tratamiento.**



¿Qué sucede si olvida una dosis?

Al igual que muchos medicamentos, **Rayaldee** necesita tomarse con regularidad. Si olvida una dosis, tome **Rayaldee** a la siguiente hora programada. **No tome una dosis adicional para compensar la dosis olvidada.** Puede crear recordatorios en el calendario de su teléfono o colocar una nota cerca de la mesa de noche para que no olvide **tomar Rayaldee todas las noches**.

También, puede instalar una aplicación, como Medisafe®, una plataforma móvil para el manejo de medicamentos (en su teléfono iOS o Android).

¿Cómo se recibe apoyo para la cubierta?

OPKO CONNECT

La mayoría de los pacientes tienen que desembolsar por **Rayaldee** un gasto de **menos de \$10 al mes**. Los pacientes elegibles con seguro comercial pagan \$0*. Si no tiene cubierta de seguro de farmacia o no puede costear su copago, llame a la oficina de su médico. Usted pudiera calificar para el **Programa de Asistencia para el Paciente (PAP)** de **OPKO Connect** que ofrece medicamentos gratis**.

Los servicios de OPKO Connect están disponibles de lunes a viernes, 8 a.m. a 8 p.m. Llámalo al **1-844-414-OPKO (6756)**.

Vea la Información de Seguridad Importante al dorso. Para la Información de Prescripción completa acceda a www.Rayaldee.com.

*Los pacientes elegibles con seguro comercial pueden obtener su receta de Rayaldee por \$0 con eVoucherRx™, un programa de RelayHealth que de forma automática aplica ahorros de copago en la farmacia del paciente. Si su farmacia no tiene acceso a RelayHealth eVoucherRx™, entonces OPKO Connect tiene un programa de copago de \$0 por mes para pacientes elegibles con seguro comercial. El desembolso para pacientes elegibles con Subsidio por Bajos Ingresos de la Parte D de Medicare normalmente es \$0 - \$10.35 por mes (fuente: datos de 2023 de OPKO Connect y Farmacias Especializadas).

**Pueden aplicar criterios de elegibilidad y requiere reinscripción anual.

¿TIENE PREGUNTAS DE CÓMO MANTENER EL CURSO DE SU TRATAMIENTO?

Su profesional de la salud es su mejor fuente de información respecto a su condición, asegúrese de conversar con su médico en caso de tener alguna pregunta sobre Rayaldee.

Conozca cómo seguir recibiendo tratamiento con nuestros recursos digitales.



 [YouTube](#)



[Rayaldee.com](#)



Información de Seguridad Importante

- Antes de comenzar Rayaldee, el nivel de calcio en la sangre debe encontrarse dentro del rango normal (por debajo de 9.8 mg/dL). Su médico puede decirle si su nivel de calcio es adecuado para comenzar Rayaldee.
- Rayaldee puede causar hipercalcemia e hipercaliuria (niveles altos de calcio en la sangre y la orina, respectivamente). Déjelo saber a su médico si está usando otros medicamentos, entre ellos otros medicamentos que contienen vitamina D (suplementos de vitamina D recetados o sin receta). Su médico puede indicarle que suspenda su uso mientras toma Rayaldee, ya que los niveles muy altos de calcio debido a niveles altos de vitamina D pudieran causar cambios graves en el ritmo cardíaco o convulsiones y requerir tratamiento de emergencia.
- Déjelo saber a su médico de cualquier medicamento que esté usando. Mientras toma Rayaldee, déjelo saber a su médico si recibe un medicamento recetado nuevo o comienza algún medicamento no recetado nuevo.
- Déjelo saber a su médico de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas indicativos de niveles de calcio muy altos: sensación de cansancio, dificultad para pensar con claridad, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, aumento de sed, aumento en la cantidad de orina, pérdida de peso o cualquier otro síntoma o efecto secundario anormal.
- Mientras toma Rayaldee, su médico ordenará análisis de laboratorio para conocer como está su hiperparatiroidismo secundario (SHPT, por sus siglas en inglés). Estos análisis de laboratorio también examinarán sus niveles en la sangre de calcio, fósforo, 25-hidroxivitamina D y HPT. A base de los resultados de sus pruebas, su dosis de Rayaldee puede cambiar o suspenderse hasta tanto mejoren los resultados de laboratorio.
- Los efectos secundarios más comunes de Rayaldee informados por pacientes en los estudios clínicos fueron anemia (niveles bajos de glóbulos rojos o hemoglobina), infección nasal y/o de garganta, niveles altos de creatinina sérica (un examen de laboratorio para medir la función renal), falta de aliento, tos, insuficiencia cardiaca congestiva y estreñimiento.
- Tome su Rayaldee al acostarse a dormir en la noche y trague sus cápsulas enteras; no las muerda ni las mastique.
- Si omite una dosis, tome Rayaldee a la próxima hora programada. No tome una dosis adicional para compensar la dosis que no se tomó.
- Asegúrese de seguir las instrucciones de su médico, incluido hacerse los análisis de laboratorio a tiempo.

Vea la **Información de Seguridad Importante** y la **Información de Prescripción completa** en [www.Ryaldee.com](#).

